

醫

方

論

醫方論卷四

黃連解毒湯

黃連 黃芩 黃柏 梔子 等分

此治實邪實火表裡俱盛之劑。故用黃芩瀉肺火。黃連瀉心火。黃柏瀉腎火。又用梔子令上焦之熱邪委婉而下。三焦通治。藥力頗峻。若表裡俱熱。胸痞便閉。譫語者。便當去黃芩。加大黃以通之。使滯去而熱亦退。須細辨之。

附子瀉心湯

大黃

兩一

黃連

黃芩

兩一

附子

一枚去皮

傷寒痞滿在心胸而不在胃故用三黃以瀉痞而去熱然惡寒汗出陽氣亦虛故用附子溫腎固陽寒熱並用各有精義非仲景其孰能之

半夏瀉心湯

半夏

半升

黃連

兩一

黃芩

甘草

炙

人參

乾姜

三兩大棗 十二枚

此爲誤下胸痞而設。陽邪鬱於上焦。既不能下。又不能仍從毛竅而出。惟有苦寒瀉熱之法。方能消痞解邪。而又恐陽邪既去。濁陰上干。故於清瀉中。參入辛溫。以預截後患。此所以爲醫中之聖也。

白虎湯

石膏 一觔
知母 六兩
甘草 二兩
粳米 六合

先煮石膏數十沸再投藥米米熟湯成溫服
同一石膏也合麻黃用之則爲青龍合知母
用之則爲白虎一則欲其興雲致雨以解外
邪一則欲其清肅肺胃滌蕩內熱義各有當
也然用此方者必須審而又審自汗而渴脈
大有力數者咸脩方可與之若一誤投禍不
旋踵蓋緣此症爲濕熱鬱蒸故有汗而煩熱
不解既有汗故不可表表則陽脫亦不可下

下則耗陰。惟有大清肺胃之熱。爲正法也。

竹葉石膏湯

竹葉二把石膏一斤人參三兩甘草炙二兩麥冬一觔

半夏半升粳米半升加姜煎

治肺胃虛熱。故加人參麥冬。加竹葉者。恐虛陽內犯。胞絡也。

升陽散火湯

柴胡八錢防風二錢葛根五分升麻一錢羌活一錢

獨活 人參 白芍 五錢 炙甘草 三錢

生甘草 三錢 每服五錢加姜棗煎

鬱結之火逆而折之則其勢愈激而上升此則全用風藥解散蓋火得風力而升亦因風力而滅故絕不用清寒之品深達火鬱則發之之義也。

涼膈散

連翹

四大黃酒浸

芒硝

甘草

二梔子

炒黑

黃芩酒炒薄荷雨爲末每服三錢加竹葉生蜜

煎

解此方者。但云此上中二焦瀉火之藥。既下焦無病。豈得輕用芒硝。觀仲景三承氣湯。邪在上者。不用芒硝。可知也。殊不知主治條下有大小便秘一語。則下焦安得不並治乎。

當歸龍薈丸

當歸

酒洗

龍胆草

酒洗

梔子

炒黑

黃連

炒

黃柏

炒

黃芩

炒兩

大黃

酒浸

青黛

水飛

蘆薈

錢五

木香

二錢

麝香

五分

蜜丸

姜湯下

苦寒之至無以復加此等峻劑豈可輕試予

意去三黃二香庶幾可用耳

龍胆瀉肝湯

龍胆草

酒炒

黃芩

炒

梔子

酒炒

澤瀉

酒炒

當歸

酒炒

車前子

木通

生地

酒炒

柴胡

生甘草

肝胆火盛濕熱鬱蒸者此方爲宜下部發瘍

者尤妙

左金丸

黃連

六兩
汁炒

吳茱萸

一兩
鹽水炒

水丸

此方之妙全在苦降辛開不但治脇痛肝脹
吞酸疝氣等症卽以之治時邪霍亂轉筋吐
瀉無不神效

瀉青丸

龍胆草

山梔

炒

大黃

酒蒸

川芎

當歸

酒洗

羌活 防風 等分蜜丸竹葉湯下
肝性至剛宜柔而不宜伐此方但瀉肝經之
鬱火則可若以之治驚恐筋痿等症吾未見
其有濟也若去大黃加芍藥丹皮等類爲庶
幾耳

瀉黃散

防風 四兩 藿香 七錢 山梔 炒黑一兩 石膏 五錢 甘草 二錢
右末微炒香酒調服

有風藥以散伏火。有清藥以瀉積熱。而又用
甘緩以和中。使不傷正氣。此法頗佳。

清胃散

生地 丹皮 黃連 當歸 升麻

涼血解熱升陽散火。胃氣清則諸病自除矣。

甘露飲

生地 熟地 天冬 麥冬 石斛 茵陳

黃芩 枳殼 枇杷葉 甘草 等分每服

五錢

治胃虛發熱兼有血症者則可。若積濕化熱。又無血症者。當去地黃。加花粉茯苓等爲佳。
瀉白散

桑白皮 一錢
地骨皮 一錢
甘草 五分
粳米 百粒

易老加黃連

肺金有火。則清肅之令不能下行。故洒淅寒熱而咳嗽喘急。瀉肺火而補脾胃。則又顧母

法也。若加黃連反失立方之旨。

導赤散

生地 木通 甘草梢 淡竹葉 等分煎
心經之火每移於小腸。表裡相傳也。故治小
腸之火必兼清心。此爲定法。

蓮子清心飲

石蓮肉 人參 黃芪 茯苓 柴胡 三錢

黃芩 炒 地骨皮 麥冬 車前子 甘草 炙

二錢

空心服

柴胡散肝胆之陽邪。木不助火。則心氣亦安。又有參芪足以制之。故雖發熱煩渴而不相妨也。

導赤各半湯

黃連

黃芩

犀角

知母

山梔

滑石

甘草

茯神

麥冬

人參

加燈心

棗煎

越經症。乃心經之熱邪上而通肺本。與小腸

無關其必兼瀉小腸者欲令上焦之邪俱從小腸出也。

普濟消毒飲

黃芩

酒炒

黃連

酒炒五錢

陳皮

去白

甘草

生用

玄參

二錢

連翹

板藍根

馬勃

鼠粘子

薄荷

二錢

僵蚕

升麻

七分

柴胡

桔梗

二錢

爲末湯

調時時服之

天行厲氣最爲酷烈病在上焦者天氣中人。

必於上也。此方清熱解毒，祛厲疫之氣，最爲精當。

清震湯

升麻 蒼朮 五錢 荷葉 一枚

雷頭風頭本風陽上擾之症，故宜升散而不宜清寒。

紫雪

黃金

兩

寒水石

石膏

滑石

磁石

水煮三觔

搗煎去渣入後藥升麻 玄參 甘草 炙牛勛 犀角

羚羊角 沉香 木香五兩丁香一兩並搗剉

煎去渣入後藥朴硝硝各一斤提淨入前藥汁中

候汁欲凝辰砂三兩麝香一兩二錢研細入

再入後藥合成退火氣冷水調服每一二錢

清火解毒清神辟穢色色俱備治溫疫熱毒

障氣極佳

人參清肌散

人參 白朮 茯苓 甘草炙 當歸 赤芍

柴胡 乾葛 半夏麴 加姜棗煎

四君以補氣。歸芍以養血。營衛調則虛煩自退。加柴葛者。因潮熱無汗。欲使陽明之邪從肌表出也。

白朮除濕湯

人參 赤茯苓 甘草炙 柴胡錢五 白朮一兩

生地黃 地骨皮 知母 澤瀉七錢 每服

五錢

濕勝必化熱。重陰生陽也。此方名曰除濕。而清熱之法。悉寓乎其中。此真善於清熱者。

清骨散

銀柴胡

一錢五分

胡黃連

秦艽

鱉甲

童便炙

地骨皮

青蒿

知母

二錢

甘草

炙五分

病至骨。蒸勞熱。全是有陽無陰矣。大劑養血。尙恐不及。徒用清涼。豈能有濟。且反傷胃氣。

非善治也。

石膏散

石膏 研細每夕新汲水服方寸匕取熱退
爲度

石膏。非可常服之物。前哲雖有是方。吾不取
也。

二母散

知母 炒 貝母 炒 等分爲末服 古方二母各

一兩加巴霜十粒姜三片臨卧白湯嚼服
但用二母力亦淺薄古方加巴霜十粒尤爲
不倫

利膈湯

薄荷 荊芥 防風 桔梗 甘草 人參
牛旁子 炒等分爲末每服二錢或加姜蚕
痰火閉塞故成咽痛寒涼遏抑益之病耳此
用輕清解散之法全不用寒涼最爲妙法

甘桔湯

甘草

兩二桔梗

兩一或等分

甘桔二味爲咽喉必用之藥至於加味之法則當隨症而施

玄參升麻湯

玄參

升麻

甘草

等分

元參清上焦浮游之火升麻升陽而解毒甘草清熱而解毒藥只三味簡而能到

消斑青黛飲

青黛

黃連

犀角

石膏

知母

玄參

梔子

生地

柴胡

人參

甘草

加姜棗煎

消毒化斑頗爲有力。若實火熾盛則地黃人

參尙宜酌減

玉屑無憂散

玄參

黃連

荆芥

貫衆

茯苓

甘草

山豆根 砂仁 滑石 錢五 礞砂 寒水石 錢三

爲末每一錢先挑入口徐以清水咽下

此治實火實痰之重劑若虛火聚於咽喉閉結不通者萬不可用

香連丸

黃連 二十兩 吳茱萸 十兩 木香 四兩 醋糊丸米

飲下

裡急後重者氣不通也此亦苦降辛開之法

白頭翁湯

白頭翁

二兩

秦皮

黃連

黃柏

三兩

香連丸治氣分不通之後重。此則治熱傷營血之後重。故但清降而不用氣分藥。

腎熱湯

磁石

煅紅

牡蠣

鹽水煮

白朮

炒五兩

麥冬

芍藥

四兩甘草

兩生地汁

蔥白

大棗

十五枚

分三服

清寒重鎮。所以歛陰退火。加以健脾和胃。故爲有制之師。

辛夷散。

辛夷

白芷

升麻

藁朮

防風

川芎

細辛

木通

甘草

等分爲末。每服三錢。

茶調下。

辛散太過。疎風散寒則宜之。非瀉火門中之法。

蒼耳散

白芷

一兩

薄荷

辛夷

五兩

蒼耳子

炒二錢五分

爲末

食前葱茶湯調下二錢

臭○淵○一○症○有○爲○火○燥○有○爲○風○乘○有○爲○寒○侵○種○
種○不○同○此○但○可○施○於○風○乘○者○耳○亦○非○瀉○火○門○
中○之○法○也○

二陳湯

半夏

姜製二錢

陳皮

去白

茯苓

一錢

甘草

五分

加姜煎

痰之爲病最烈痰之爲病亦最多積濕與鬱火二者爲生痰之大源其餘或因風或因寒或因氣或因食變怪百出隨感而生難可枚舉治痰大法濕則宜燥火則宜清風則宜散寒則宜溫氣則宜順食則宜消二陳湯爲治痰之主藥以其有化痰理氣運脾和胃之功也學者隨症加減因病而施則用之不窮矣

潤下丸

廣陳皮

去白八兩
鹽水浸洗

甘草

二兩
蜜炙

蒸餅糊丸

此治痰而兼停飲者

桂苓甘朮湯

茯苓

四兩
桂枝

白朮

二兩
甘草一兩

此治痰而兼有風者

清氣化痰丸

半夏

姜製

胆星

一兩
五錢

橘紅

枳實

麩炒

杏仁去尖括婁仁去油黃芩酒洗茯苓一兩

薑汁糊丸淡薑湯下

此治痰而兼有火者。

順氣消食化痰丸

半夏姜製胆星一青皮陳皮去白萊菔子生用

蘇子炒山查炒麥芽炒神麴炒杏仁去皮尖

葛根 香附製各一兩姜汁糊蒸餅為丸

此治痰而兼有食者。

清肺飲

杏仁

去皮尖

貝母

茯苓

錢一

桔梗

五味子

甘草

橘紅

五分

加姜煎

此治痰而兼有濕火者

金沸草散

旋覆花

前胡

細辛

錢一

荆芥

五分

半夏

五分

赤茯苓

六分

甘草

炙三分

加姜

棗煎

此治痰而兼疎風者

百花膏

百合 款冬花 等分蜜丸

此治痰而兼清熱者

三仙丹

南星麴 半夏麴四兩 香附二兩 糊丸

此治痰而兼理氣者

半夏天麻白朮湯

半夏姜製 麥芽一錢五分 神麴炒 白朮炒一錢 蒼朮酒浸

人參

黃芪

製蜜

陳皮

茯苓

澤瀉

天麻

五分

乾薑

三分

黃柏

二分

酒洗

每服五錢

此治痰而兼息風者

茯苓丸

半夏

麴兩

茯苓

乳一兩

枳殼

五錢

麴炒

風化硝

五分

薑汁糊丸

此治痼結之頑痰。非大實者不可輕投。

控涎丹

甘遂去心大戟去皮白芥子 等分爲末糊丸臨

卧姜湯服

此治痰而兼遂水者亦不可輕用。

三子養親湯

紫蘇子 白芥子 萊菔子 各微炒研煎

服

此治痰而兼降氣者。

滌痰湯

半夏

姜製

胆星

二錢五分

橘紅

枳實

茯苓

二錢

人參

菖蒲

一錢

竹茹

七分

甘草

五分

加姜煎

此治痰而兼去風清心者

礞石滾痰丸

青礞石

一兩

沉香

五錢

大黃

酒蒸

黃芩

八兩

右將礞石

打碎用朴硝二兩同入瓦礮鹽泥固濟晒乾

火煨研末和諸藥水丸

此治實痰實火者

半黃丸

胆星

全蝎

去足焙

蟬蛻

二錢五分

牛黃

白附子

殭蚕

洗焙

防風

天麻

一錢五分

麝香

五分

煮棗肉和

水銀五分細研入藥末爲丸荆芥姜湯下

此治痰而兼息風清心者

辰砂散

辰砂

兩乳香

棗仁

五錢

溫酒調下

此治痰而兼定驚者

白金丸

白礬三兩鬱金七兩薄荷糊丸

此治痰而兼解鬱者

青州白丸子

白附子生用南星生用半夏水浸生衣生用二兩

川烏去皮臍生用五錢爲末絹袋盛之水擺出粉末

盡再搖再擺以盡爲度貯磁盆日晒夜露春

五日夏三日秋七日冬十日晒乾糯米糊丸

如菜豆大每服二十九姜湯下

此治痰而兼祛風者。

星香散。

胆星。

八錢

木香

二錢

爲末服

此治痰而兼行氣者。

常山飲

常山

燒酒炒二錢

草薢

煨

枳櫛

知母

貝母

一錢

烏梅

二錢

姜三片棗一枚半酒半水煎露一宿

日未出時面東空心溫服
此治痰而兼分陰陽者瘧不可截用此方者
每貽後患大率邪伏於內脾氣受傷致成脹
滿者多矣

截瘧七寶飲

常山

酒炒

草菓

煨

檳榔

青皮

厚朴

陳皮

甘草

等分用酒水各一鍾煎熟絲綿蓋之

露一宿于當發之早面東溫服

較前方之用知母烏梅者稍可。然亦非正法也。

平胃散。

蒼朮酒浸二錢厚朴姜炒陳皮去白甘草炙一錢加姜棗煎。

人非脾胃。無以養生。飲食不節。病卽隨之。多食辛辣。則火生。多食生冷。則寒生。多食濃厚。則痰濕俱生。於是爲積聚。爲脹滿。爲瀉痢。種

種俱見。平胃散乃治脾胃之聖劑。利濕化痞。消脹和中。兼治時疫瘴氣。燥而不烈。故爲消導之首方。

枳木丸

白木

三兩
土蒸

枳實

一兩
麩炒

爲末。荷葉包陳米飯煨

乾爲丸

一補脾。一去實。簡當有法。勿以其平易而忽之。

保和丸

山查

三兩

神麴

炒

茯苓

半夏

一兩

陳皮

萊菔子

微炒

連翹

五錢

麴糊

九麥芽湯

下

此亦和中消導之平劑惟連翹一味可以減

去

健脾丸

人參

白朮

土炒二兩

陳皮

麥芽

炒一兩

枳實

三兩

山查

一兩五錢

神麴

糊

丸米飲下

枳實消痞丸

此乃補中用消之法。正其善於用補也。否則滯濁之氣不清。縱有補劑。必且格而不入矣。

枳實

炒

黃連

炒

厚朴

姜炒

半夏

炒

茯苓

三錢

麥芽

炒

人參

炒

白朮

炒

甘草

炙

茯苓

三錢

乾姜

二錢

蒸餅

糊丸

此方佳處全在姜連苦辛。便能平木。否則全不關照肝經。主治條下右關脈弦一語。其謂

之何

痞氣丸

黃連

八錢

厚朴

五錢

吳茱萸

三錢

白木

土炒

黃芩

二錢

茵陳

酒炒

乾姜

炮

砂仁

一錢五分

人參

一錢

茯苓

一錢

澤瀉

一錢

川烏

炮

川椒

炒

桂

五錢

巴豆霜

四分

蜜丸

燈草湯下

攻補兼行而又苦辛開降頗有意義惟川烏

巴霜則斷不可用

葛花解醒湯

葛花。豆寇。砂仁錢一。木香分一。青皮。陳皮。

人參。白朮炒。茯苓分四。神麴炒。乾姜。猪苓。

澤瀉分三

補脾利濕。又兼快胃。故能治吐瀉痞滿等症。用葛花者。所解酒毒。

鯨甲飲

鯨甲醋炙。白朮土炒。黃芪。芎藭。白芍酒炒。枳櫚。

草菓

煨麴

厚朴

陳皮

甘草

等分姜三片

棗一枚烏梅少許煎

此亦攻補並行之劑但欲去瘧母故以鱉甲

爲君耳

赤石脂禹餘糧湯

赤石脂

禹餘糧

等分杵碎煎

利在下焦者小腸之水不從膀胱化出也故仲景有服此湯復利不止當利其小便之訓

桃花湯

赤石脂 一觔 乾姜 一兩 粳米 升一

病在下焦。腎臟虛寒。下利膿血。不由傳經。亦非協熱。故用收瀉而兼甘溫。乃仲景之變例也。

訶子飲

御米

去帶蜜炒五分

訶子

去核七分

乾姜

炮六分

橘紅

五分

右末空心服

栗。訶子。性皆寒。瀉。故用乾姜。橘皮。以通陽。
 此從桃花湯化出。

真人養藏湯。

罌粟殼去帶炙三兩六錢 訶子超襄煨一兩三錢 木香二兩四錢

肉豆蔻超襄煨五兩 肉桂八錢 人參 白朮炒當歸

六錢 白芍炒一兩六錢 生甘草一兩八錢 每服四錢

此亦瀉中寓溫之法。加入補氣補血之藥。於久病正虛者尤宜。

當歸六黃湯

當歸 生地 熟地 黃芩 黃柏 黃連

等分黃芪加倍

此氣血平補而兼瀉火之劑。並無瀉藥。不宜
收入瀉門。

牡蠣散

牡蠣煅研 黃耆 麻黃根錢一 浮小麥百粒 煎服

固表清煩。卽以止汗。此法是也。

柏子仁丸

柏子仁

炒研去油二兩

人參

白朮

半夏

五味子

牡蠣

麻黃根

一兩 麥麩 五錢

棗肉丸米飲下五十丸日三服

養心陰而實肌表故能補虛止汗。

茯兔丹

兔絲子

十兩

五味子

八兩

石蓮肉

白茯苓

三兩

山藥

六兩

將兔絲用酒浸浸過餘酒煮山藥

糊爲丸

亦補腎瀉精之平劑。腎氣虛寒者可用。若有火者則鬼絲尙宜酌易。

治濁固本丸

蓮鬚 黃連二兩 黃柏 益智仁 砂仁

半夏姜製 茯苓一兩 猪苓二兩 甘草炙三兩

寓瀉於利用意甚佳。濕熱不去則濁無止時。徒用瀉藥反致敗精塞竅矣。

水陸二仙丹

金櫻膏

一熬膏

芡實

一熟為粉

和丸

亦能濟精固氣。但力量甚薄。尚須加味。

金鎖固精丸

沙苑蒺藜

炒

芡實

蒸

蓮鬚

二兩

龍骨

酥炙

牡蠣

鹽水煮一日一夜煨粉

一兩

一

蓮子粉為糊丸

潛陽納氣火不動則精宮自固矣。

人參樗皮散

人參

樗根白皮

東引者去粗皮醋炒

等分爲末米

飲或酒調下

日久血虛濕退者方可。若濕熱尙重。則留邪

爲害。

桑螵蛸散

人參

茯苓

遠志

石菖蒲

鹽炒

桑螵蛸

鹽炒

龍骨

煅

龜板

酥炙

當歸

等分爲末臨卧服二

錢人參湯下

交通心腎去虛熱而固精此方最佳。

烏梅丸

烏梅

三百個

細辛

桂枝

人參

附子

炮

黃柏

六兩

黃連

一兩

乾姜

十兩

川椒

當歸

四兩

苦酒浸烏梅一宿去核蒸熟和藥蜜丸

無濕不生。觀腐草爲螢。可知也。殺虫之中。兼燥濕利濕之法。非深達本源者能之乎。

集效丸

大黃

炒一兩五錢

礬石

炒

枳櫛

訶子皮

木香

蕪夷

炒乾姜

附子

七錢五分

蜜丸食前烏梅

湯下婦人醋湯下

醋苦殺虫亦屬正法。

雄檳丸

雄黃

枳櫛

白礬

等分飯丸每五分食

遠服

藥性稍烈。虛人忌之。

化虫丸

鶴虱

胡粉

苦楝根

東引未出
土者

枳櫛

一兩

蕪夷

使君子

五錢
枯礬

二錢五分

爲末酒煮

麵糊作丸量人大小服之

亦是殺虫之法。但不如前二方之爲佳。

使君子丸

使君子

去殼
二兩

南星

姜製

枳櫛

一兩

右藥合炒如食

生米用麥芽一觔炒食茶葉用茶葉炒食炭

土用炭土炒取藥爲末蜜丸每晨沙糖水送下

於殺虫之中從其類而餌之治法殊妙。

獺肝丸

獺肝一具陰乾爲末水服二錢日三次以幽通幽而又能隨月盈縮故獨爲靈異。

消渴殺虫方

苦揀根取新白皮一握切焙入麝香少許

煎空心服

重病消渴症不常有。麝香尤屬非宜。

滋陰地黃丸

熟地

兩一

生地

方一

方一

錢五

柴胡

錢八

黃芩

酒炒

當歸

酒洗

天冬

錢五

地骨皮

錢五

五味子

錢五

人參

黃連

酒炒

甘草

炙

枳殼

麸炒

蜜丸

養陰補血兼清風火用五味子所以收耗散之氣而使瞳神復舊也。

加減駐景丸

枸杞子

五味子

車前子

炒二兩

楮實子

川椒

炒一兩

熟地

當歸

五兩

鬼絲子

入兩酒浸

蜜丸酒下

方法甚佳。惟川椒一味。辛。辣。耗。氣。必須減去。

定志丸

遠志

菖蒲

二兩

人參

茯苓

一兩

蜜丸硃砂爲

衣。張子和方無菖蒲。加茯神。柏子仁。棗仁。亦

名定志丸酒糊丸

定志丸以張子和之所加者爲佳。

地芝丸

生地

焙

天冬

四兩

枳殼

炒

甘菊花

去蒂二兩

蜜丸茶

清或酒下

枳殼一味並非欲其寬腸去滯欲其合甘菊使藥力上行也。

人參益胃湯

黃芪

人參一兩 甘草

炙入錢

白芍

炒

黃柏

酒炒三錢

蔓荊子

二錢每四錢日二服

此方極妥善但於內障一層尙少着意加穀

精石決斯爲得耳

消風養血湯

荊芥

蔓荊子

菊花

白芷

麻黃

防風

桃仁

去皮尖

紅花

酒炒

川芎

五分

當歸

酒洗

白芍

酒炒

草決明

石決明

甘草

一錢

日赤腫痛。自宜疎風清火。川芎一味辛散太過。宜減去。加蟬衣桑葉丹皮。

洗肝散

薄荷 羌活 防風 當歸 川芎 梔子

大黃 甘草 等分爲末。每服二錢。

有大黃之寒下。則川芎在所不忌。

補肝散

夏枯草 五香附 錢一 每服五錢。臘茶下。

肝無補法。養血便是補肝。此方但行氣而不養血。負此名矣。

撥雲退翳丸

當歸

一兩五錢

川芎

地骨皮

白蒺藜

荆芥

蜜蒙花

甘菊花

羌活

木賊

一兩

川椒

一錢五分

天花粉

蔓荊子

薄荷

甘草

炙五錢

枳實

五錢

黃連

蛇蛻

蟬蛻

三錢

蜜丸

去川椒蛇蛻加麝仁石決爲宜。

石膏羌活散

羌活 荆芥 白芷 藁本 細辛 川芎

蒼朮 甘菊 蜜蒙花 萊子 麻子

木賊 黃芩 石膏 甘草 等分爲末每

服一二錢

但有辛散並無滋養非法也

防風飲子

黃連炒 甘草 炙人參 一錢 當歸一分 一錢五 葛根

防風

分五細辛

蔓荊子

分三食後服

此較前方爲勝。以其有人參一味也。

羊肝丸

夜明砂

淨淘

蟬蛻

木賊

去節

當歸

一兩酒洗

羊肝

兩四

搗爛爲丸

以目入目。且能散瘀去障。故爲有法。

兔矢湯。

兔矢

二錢

茶清調服

鬼矢一味甚有意但須加養血藥

表實六台湯

四物湯

四兩每味一兩

麻黃

細辛

五錢

胎前有病若至危急方顧母而不顧子否則雖有外邪必不可傷損胎氣如此症表實無汗雖從太陽發表例而必用四物乃正法也

膠艾湯

阿膠

芎藭

甘草

二兩

艾葉

當歸

三兩

芍藥

四兩

乾地黄

水五升酒三升煮取三

升內阿膠烱化

有四物以補血而又加膠艾以和陰陽故爲
止崩漏腹痛之良法

鈎藤湯

鈎藤勾

當歸

茯神

人參

桔梗

一錢五分

桑寄生

五分

息風清火兼通筋節妙在安養心神所以能

保胎氣。

羚羊角散

羚羊角屑一錢 獨活 防風 芎藭 當歸

棗仁炒 茯神 杏仁 苡仁五分 木香 甘草

二分 加姜煎

息風清火。致爲有法。若去苡仁加貝母亦可。

紫蘇飲

蘇葉 一錢 當歸 七分 芎藭 芍藥 人參

陳皮 大腹皮 五分 甘草 二分 加姜煎 腹痛加木香延胡索
胎氣上逆自當寬中下氣加木香者猶可加
元胡索則不可以其破血礙胎也。

天仙籐散

天仙籐 卵生木香 香附 炒 烏藥 陳皮

甘草 炙 等分加紫蘇三葉木瓜生姜各三片

空心煎服

疎通血氣兼以去風。不加利濕藥者恐傷胎。

也。

白朮散

白朮

一錢

姜皮

陳皮

茯苓皮

大腹皮

五分

爲末米飲下

健脾和胃使水氣從皮膚而出故消腫而不礙裡

竹葉湯

麥冬

一錢五分

茯苓

黃芩

一錢

人參

五分

淡竹葉

十片

清心解煩。養正補虛。節節入解。

紫苑湯。

紫苑。

天冬。

錢一

桔梗。

分五

甘草。

炙

桑白皮。

杏仁。

分三

竹茹。

分二

人蜜。

溫服。

清潤肺氣。亦爲平安。

參朮飲。

當歸。

熟地。

芎藭。

芍藥。

人參。

白朮。

甘草。

炙

陳皮。

半夏。

加姜煎。

空心服。

調養榮衛化痰理氣清升濁降則胎與胞自安矣。

黑神散。

熟地 歸尾 赤芍 蒲黃炒 桂心

乾姜炒 甘草四兩 黑豆炒去皮 每服二錢酒童

便各半煎。

此方當去熟地加桃仁方爲得力

失笑散

蒲黃 五靈脂 等分爲末

產後以去瘀爲最要。此方得之

清魂散

澤蘭葉 人參三分 川芎五分 荊芥錢一 甘草炙三分

爲末溫酒調下

荊芥乃治血暈之聖藥調氣血而去外風則神自清矣

返魂丹

五月五日六月六日或小暑日益母草花正
開時連根採收陰乾用花葉及子石臼搗末
蜜丸或搗汁于砂鍋內文武火熬成膏服忌
鐵

去瘀生新則有之畢竟去瘀之力倍於生新
產後用以去惡露則可若謂其有種種功效
未免譽之太過

當歸羊肉湯

黃芪

兩一

人參

當歸

錢三

生薑

錢五

用羊肉一

觔煮汁去肉入前藥煎服

肉血有情補形補氣故元氣斂而汗自收

當歸散

當歸

芍藥

芍藥

黃芩

一觔

白朮

半觔

爲末酒調服

養榮血清血熱健脾胃而安胎懷孕者最宜

啟宮丸

芎藭 白朮 半夏麴 香附 一兩 茯苓

神麴 錢五 橘紅 甘草 錢一 粥丸

痰塞子宮不能孕育故以化痰行氣之法以通其塞

達生散

當歸 酒洗 芍藥 酒炒 人參 白朮 土炒 陳皮

紫蘇 錢一 甘草 錢二 大腹皮 三錢

入青葱五葉黃楊腦子七個煎

於峻補氣血中疎通流利使氣血不壅滯自
無留難之患

猪蹄湯

猪蹄

一隻通草

一即木通

煮食

潤而兼通較用王不留行及甲片者爲安。

人參荆芥散

人參

白朮

熟地

酸棗仁

鱉甲

童便炙

羚羊角

枳殼

柴胡

荆芥

五分

防風

甘草

芍藥

當歸

桂心

三分

加姜煎

於滋補之中用升散之法故風去而血不傷
良劑也。

柏子仁丸

柏子仁

去油

牛膝

浸油

卷柏

錢五

澤蘭

續斷

二兩

熟地

兩一

蜜丸

米飲下

去卷柏加當歸丹參茺蔚子等為佳

芎歸六君子湯

當歸 芎藭 人參 白朮 茯苓 甘草

橘紅 半夏 加姜煎

行血補氣而兼消痰則經水自無阻滯矣

連附四物湯

四物湯 加香附黃連

黃連以清血熱香附以通厥陰不涼不燥最爲合法

固經丸

龜版

炙四兩

芍藥

酒炒

黃柏

酒炒三兩

黃芩

炒二兩

香附

童便酒炒

樗皮

炒一兩五錢

酒丸

龜版黃柏黃芩多服令人絕產此等方斷不

可用。

升陽舉經湯

補中益氣湯加白芍黑梔子 姜三片棗三

枚煎

升陽退熱調和氣血故亦能止崩漏。

如聖散

櫻欄燒烏梅一兩黑姜一兩五錢爲末每服二錢烏

梅湯下

氣不攝血當以補氣爲先截止太過獨不慮積瘀爲患乎

牡丹皮散

丹皮 桂心 歸尾 延胡索三分牛膝

赤芍 莪朮六分三稜四分水酒各半煎

去瘀破結本治癥之正法惟體弱者宜酌減

正氣天香散

香附

八錢

烏藥

二錢

陳皮

蘇葉

一錢

乾姜

五分

每五六錢煎

解鬱散氣血自流行再加當歸一味亦可

和氣散

香附

四兩

陳皮

二兩

茯神

甘草

炙一兩

爲末

每服

二錢

輕淺小方服之亦無害

固下丸

檮皮

一兩五錢

白芍

五錢

良姜

煨黑

黃柏

煨黑

三錢

粥丸米

飲下

但可施於濕熱下注者耳若榮衛虧損者不可服

當歸煎丸

當歸

熟地

白芍

炒

赤芍

炒

一兩

醋糊丸

米飲下

阿膠 續斷 牡蠣 煨一兩 地榆 炒黑三錢

此治虛人之帶下尚當加氣分藥一二味

白芷散

白芷

一兩

海螵蛸

二個

胎髮

一錢

爲末

酒調下

二錢

胎髮一味極有意義用先天之血餘以治赤

帶也